

ƏLİYAR İBRAHİMOV

AMEA Naxçıvan Bölməsi

E-mail: aliyaribrahimov@mail.ru

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ƏRAZİSİNDƏ YALANÇI CİRƏ – *PIMPINELLA* L. NÖVLƏRİNİN YAYILMASI, EHTİYATI VƏ İSTİFADƏSİ

Məqalədə Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində yayılmış qiymətli efir yağlı bitkilərdən olan Yalançı cırə – *Pimpinella* L. cinsinə daxil olan növlər barədə məlumat verilir. Kərəvizkimilər – *Apiaceae* Lindl. fəsiləsinin nümayəndələri ərazinin düzən, dağətəyi, aşağı, orta və yuxarı dağ qurşaqlarındakı bitkilik tiplərində geniş yayılmışdır. Cinsin bir neçə növü ərazi florasına təəffimidlən əlavə olunmuşdur. Tərkibindəki bioloji fəal maddələrin, həmçinin efir yağının tələblərə cavab verməsi, onun tətbiqiyyətinə bəzi bitki olduğunu əsaslandırır. Tədqiqat zamanı yalançı cırə növlərinin yayıldığı əsas sahələr müəyyən edilmiş, müasir vəziyyəti, bolluğu, rast gəlmə tezliyi, fitosenozlarda iştirakı, eksperimental yolla yağ çıxışı, efir yağının miqdarı, bioloji və ekoloji şəraiti öyrənilmişdir. Rayonlar üzrə ümumi sahəsi, məhsuldarlığı, bioloji, istismar və illik tədarük həcmi hesablanmışdır.

Açar sözlər: fəsilə, cins, növ, yalançı cırə, efir yağlı, ehtiyat, tədarük.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisi iqtisadiyyətinə faydalı bitki sərvətləri ilə zəngindir. Bitkilərin tərkibində olan bir çox bioloji fəal maddələr, o cümlədən efir yağları xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələrində, tibb sənayesində, məişətdə və xalq təbabətində tətbiq olunur. Regionun florasında qiymətli efir yağlı bitkilər çoxdur. Kərəvizkimilər – *Apiaceae* Lindl. fəsiləsinə mənsub olan Yalançı cırə – *Pimpinella* L. cinsinin növləri xüsusi əhəmiyyətə malikdir.

Yalançı cırə – *Pimpinella* L. cinsinə daxil olan növlərin əsas diaqnostik əlamətləri: kasacığın dişicikləri görünür, ləçəkləri ağdır, nadir halda çəhraydır, yuxarı hissəsi oyuqlu və daxilə əyilmiş dilimlidir. Meyvəsi yumurtavari-kürəşəkillidir və ya yumurtavarıdır, ikitaylıdır azca yanlara sıxılmışdır, çılpay və ya tükəklüdür, qabırğa sapşəkillidir. 2-3 yağ kanalcıqlıdır, endosperm daxili tərəfdən yastıdır. Çoxillik, bəzən birillik-ikiillik ot bitkiləri olub, lələkli yaxud ikiqat-üçqat lələkli bۆlümli yarpaqlıdır. Cinsin 150-dən artıq növü mülayim, subtropik və tropik zonalarda, Afrikada, Avropada və Asiyada yayılmışdır. Cinsin növləri faydalı xüsusiyyətlərinə görə qədim dövrlərdən öyrənilməyə başlanmışdır [1, s. 84; 5, s. 160-171; 6, s. 137-165]. A.A.Qrossheym cinsin Qafqazda 15, Azərbaycanda 9 növünün olduğunu qeyd edir ki, onlardan 7 növ: *Pimpinella rhodantha* Boiss., *P. major* (L.) Huds., *P. saxifraga* L., *P. peucedanifolia* Fisch., *P. caucasica* B.Schischk., *P. Woronowii* B.Schischk., (= *P. servariaefolia* nom fr. et Sint. auct.), *P. confusa* Woronow Naxçıvan MR ərazisi üçün göstərilir [4, s. 227-229]. “Флора Азербайджана” [10, s. 126] fundamental əsərdə isə 6 növ: *P. saxifraga* L., *P. rhodantha* Boiss., *P. squamosa*, *P. peucedanifolia* Fisch., *P. antriscoides* Boiss., *P. confusa* Woronow verilmişdir. A.A.Qrossheymın muxtar respublika florası üçün göstərdiyi 2 növ: *P. major* (L.) Huds. və *P. caucasica* B.Schischk. Azərbaycan florasında region üçün verilmir, *P. confusa* isə Naxçıvan MR florasına əlavə olunmuşdur [9]. Naxçıvan Muxtar

Respublikası florasının taksonomik spektrində 11 növün olduğu qeyd olunur: *Adi yalançı cırə – Pimpinella anisum L.*, *Keşnişi y.c. – P. antriscoides Boiss.*, *Ətirli y.c. – P. aromatica Bieb.*, *Qızılı y.c. – P. aurea DC. (Reutera aurea (DC.) Boiss.*, *Oxşar y.c. – P. peregrina L. (P. affinis Ledeb.)*, *Acımtıl y.c. – P. peucedanifolia Ledeb.*, *Qatışıq y.c. – P. pseudotragium DC. (P. confusa Woronow)*, *Pəmbəli y.c. – P. puberula (DC.) Boiss.*, *Açıqrang y.c. – P. rhodantha Boiss.*, *Daşdalan y.c. – P. saxifraga L.*, *Zirehli y.c. – P. squamosa Karjagin [4, s. 157-158].* “Конспект флоры Кавказа” kitabında Naxçıvan MR üçün 11 növün olduğu göstərilir, ancaq nədənsə hər yerdə becərilən, bəzən yabanlaşmış *Adi yalançı cırə – Pimpinella anisum L.* verilir. *P. squamosa* Karjagin növünün Cənubi Qafqazda ancaq Naxçıvan MR-də yayıldığı bildirilir və sual altında endemik kimi qəbul edilir. Həmçinin *P. peregrina L. (P. affinis Ledeb.)* növü *P. affinis Ledeb.* kimi verilmis və *P. peregrina L.* ləğv olunmuşdur. Bu qayda da növdaxili dəyişiklik apararaq *P. pseudotragium DC. (P. confusa Woronow)* növündən *P. confusa Woronow* növünü ayırmaqla, *P. pseudotragium DC.* və *P. confusa Woronow* müstəqil növlər kimi verilir [7, s. 85-88]. Beləliklə, son nəticədə regionda 11 yox, 12 yalançı cırə növünün olduğu daqiqləşdirilmişdir.

Adi yalançı cırə – *Pimpinella anisum L. Becərilən bitkidir. Hündürlüyü 30-50 sm-dir, düzqalxan, dairəvi, şırımlı və yuxarı hissəsi budaqlanandır. Kökü nazik olmaqla, milbənzərdir. Kökərtiyi aşağı yarpaqları uzun saplaqlı, dairəvi böyrəyabənər, bütöv, kəsilmiş-dişcikli və ya pərlidir. Çiçəkləri kiçik, beşbölmümlü, gərkəmsiz olub, gövdənin sonunda mürrəkəb çətirə toplanmışdır. Yumurtə və ya armudşəkilli qoşadan meyvəsi tutqun boz-yaşıl rəngli olub, kələ-kötürdür. Əzəddə spesifik ətirli iyə və şirintəhər dadı malikdir. İyun-iyul aylarında çiçəkləyir, avqustda isə meyvələri yetişir. Yabani halda Aralıq dənizinin ətrafında və Kiçik Asiya ölkələrində yayılmışdır. *Adi cırənin* meyvələri yetişməyə bir əvəz qalmış (avqustda) toplanılır. Yağ, neft və sabun istehsalında istifadə edilən bu bitki əvəzədləmə sayılır. *Adi yalançı cırə* yaxşı nektarlı bitkidir. Meyvəsi bəliq və ot sənyəsinə, şirniyyatların, içkilərin hazırlanmasında və çörəkbişirmədə istifadə olunur. Eyni zamanda böyrək və sidik yollarının iltihabında, qaraciyər və mədəaltı vəzinin sekretor funksiyasının stimullaşdırılmasında, anasid gastritlərdə və meteorizmə təyin edilir. Yağından tənəffüs yollarının katarında, traxeit və laringitdə, müxtəlif səbəblərdən yaranan öskürəklərdə istifadə edilir.

Tərkibində əsas təsiredici maddəsi 1,5-3% olan efir yağdır. Yağın əsas tərkib hissəsi metilxavikol, az miqdarda zirə aldehid və zirə turşusundan ibarətdir. Meyvələrində efir yağından başqa piyli yağlar və zülali maddələr vardır. Piyli yağın bərk hissəsi kakao yağını əvəz edir. Quru meyvələrinin tərkibində 1,2-3,5% (bəzən 6%) efir yağı, 16-28% piyli yağlar, 19%-ə qədər zülali maddələr, şəkər və üzvi turşular vardır. Başlıca olaraq 80-90% anetol, 10% metilxavikol, cırə aldehid, cırə ketonu, cırə spirti, cırə turşusu, α-fellandren, α-pinen, dipenten, kamfen və asetaldehidlər vardır. Tibbdə *adi yalançı cırədən* bir sıra preparatlar şəklində bəlgəmgətirici, həzm sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırıcı və dadverici maddə kimi geniş istifadə edilir. Belə preparatlardan nasatır-cırə damcı – *Liquar Ammonii anisatus*, sinə eliksiri – *Elaxir pectorale*, tıryəklı benzoy tinkturu – *Tinctura Opii benzoca* və digərlərini misal göstərmək olar. Bundan əlavə, sinə və işləmə yüngütlənilən, həmçinin də Trastkovun astma əleyhinə işlənen çoxkomponentli miksturəsinin tərkibinə daxildir. Cırədən alınan preparatlar iltihabsorucu, antiseptik, spazmolitik, tərqovucu və işlədici təsirlidir. Eyni zamanda bronx və bağırsaq vəzinin sekresiyasını gücləndirir, sayə əzələlərin spazmını aradan götürür.

Keşnişi yalançı cırə – Pimpinella antriscoides Boiss. Çoxillik mezofit bitkidir. Gövdəsi çılpaq və çubuqvırı budaqlanmışdır. Kökərtiyi yarpaqları uzun saplaqlı, ikiqat

lələkvəri parçalı, son seqmenti uzunsov, kütəpəyli və dişcikli. Yuxarı yarpaqları oturaq, azsaylı neştərvəri, lələkvəri bölmümlü seqmentlidir. Çətiri 12-15 şüalı, örtük və örtüklük yarpaqları azsaylı xətti-neştərvəridir. Çiçəkləri ağdır. Orta və subalp qurşaqların meşə və çəmənliklərində yayılmışdır. İyun-iyul aylarında çiçəkləyir və meyvələri yetişir. Böyük və Kiçik Qafqazda, Naxçıvan MR-in dağlıq ərazilərində: Şəur-Sədərkə rayonlarında Sustdağı, Ələngəzdağı, Qaraquşdağı, Şahbuz rayonunun Badamlı, Şada kəndləri, Culfa rayonunun Ərəfsə, Lakatəg, Başkənd, Boyəhməd kəndləri, Alçalıdağı, Göydağ və Ordubad payonunun Nüsnüs, Dirmis, Unus, Şurut, Gal kəndləri ətrafında yayılmışdır. İranda və Türkmənistanı da rast gəlinir.

Ətirli yalançı cırə – Pimpinella aromatica Bieb. İkiillik (və ya çoxillik) İberiya-Alban coğrafi tipinə mənsub kserofit bitkidir. Gövdəsi (20) 40-80 sm hündürlükdə, qısa tükcüklü, qalxanvırı budaqlanan, aşağı yarpaqları lələkvəri, 3-4 cüt uzunsov-pazvırı yarpaqcıqlıdır. Yuxarı yarpaqların yarpaqcıqları oturaq, xətti-qılıvrı pəncəli. Ləçəkləri ağ və arxası tükcüklüdür. Orta dağlıq qurşağın daşlıq ərazilərində yayılmışdır. İyun-iyul aylarında çiçəkləyir, avqustda meyvə verir. Böyük Qafqazda, Qobustanda, Naxçıvan MR-in dağlıq ərazilərində yayılmışdır. 1986-1988-ci illərdə Mehdiyeva N.P., İbrahimov Ə.Ş. tərəfindən *Pimpinella affinis* Ledeb. və *P. aromatica* Bieb. növləri yeni aşkar edilmişdir [9, s. 86-91]. AMEA Botanika İnstitutunun biokimyə laboratoriyasında yeni tapıntıların efir yağı alınmış öyrənilərək, Bakı şəhərinin bir neçə yeyinti, şirniyyat müəssisələrində sınaqdan keçirilmiş və müsbət nəticələr alınmışdır [9]. Hazırda, tətbiq-yönümlü işlərin aparılmasına, yeni perspektivli bitki xammal mənbələrinin tapılmasına ciddi fikir verilir. Cinsə aid olan növlər müxtəlif istiqamətlərdə öyrənilməyə xammal kimi ehtiyatı öyrənilməmişdir. Yalançı cırə növlərinin Azərbaycanıda Böyük Qafqazın Quba, Qonaqkənd, Dəvəçi rayonlarında və Qobustanda yayıldığı göstərilir. Orta dağ qurşağında – gillidə-dəyişən yamaclarda, kolluqlarda, ardıcılıqda, otlu yamaclarda yayılmışdır. Respublika ərazisindən kənarda Dağıstanda, Şərqi Zaqaqaziyada vardır. Xızı rayonunun Qurdubulaq ərazisindən təsvir olunmuşdur.

Qızılı yalançı cırə – Pimpinella aurea DC. (Reutera aurea (DC.) Boiss. İran coğrafi tipinə mənsub olan çoxillik kserofit bitkidir. Gövdəsi 50-100 sm hündürlükdə, qısa və yumşaq tükcüklü, aşağı yarpaqları ikiqat lələkvəri parçalı, yumurtavəri-uzunsov, dişcikli pərlı, xırda son paylıdır. Çətiri 4-7 şüalıdır, ləçəkləri yumşaq tükcüklü və sarı rənglidir. Orta dağ qurşağının daşlıq ərazilərində yayılmışdır. İyun-iyul aylarında çiçəkləyir və meyvə verir. Kiçik Qafqazda, Naxçıvan MR-in düzənlik, dağlıq ərazilərində yayılmışdır. Meyvələrində ətriyyət sənyəsi üçün yararlı müxtəlif aromati efir yağları vardır. Milax, Qazançı, Sultanbut ərazilərində, Kola, Duman, Tillək və Batabat meşələrində yayılmışdır.

Oxşar yalançı cırə – Pimpinella affinis Ledeb. (= P. peregrina L.) İkiillik, çox qısa yumşaq tükcüklü bitkidir. Nazik kəndirşəkilli kökləri vardır. Gövdəsi düzdür, silindrik, nazik zolaqlıdır, budaqlıdır. (25) 40-90 (100) sm hündürlükdə. Kökərtiyi və drkidir, nazik zolaqlıdır, budaqlıdır. Çətiri 4-7 şüalıdır, ləçəkləri yumşaq tükcüklü və sarı rənglidir. Orta dağ qurşağının daşlıq ərazilərində yayılmışdır. İyun-iyul aylarında çiçəkləyir və meyvə verir. Kiçik Qafqazda, Naxçıvan MR-in düzənlik, dağlıq ərazilərində yayılmışdır. Meyvələrində ətriyyət sənyəsi üçün yararlı müxtəlif aromati efir yağları vardır. Milax, Qazançı, Sultanbut ərazilərində, Kola, Duman, Tillək və Batabat meşələrində yayılmışdır.

Oxşar yalançı cırə – Pimpinella affinis Ledeb. (= P. peregrina L.) İkiillik, çox qısa yumşaq tükcüklü bitkidir. Nazik kəndirşəkilli kökləri vardır. Gövdəsi düzdür, silindrik, nazik zolaqlıdır, budaqlıdır. Çətiri 4-7 şüalıdır, ləçəkləri yumşaq tükcüklü və sarı rənglidir. Orta dağ qurşağının daşlıq ərazilərində yayılmışdır. İyun-iyul aylarında çiçəkləyir və meyvə verir. Kiçik Qafqazda, Naxçıvan MR-in düzənlik, dağlıq ərazilərində yayılmışdır. Meyvələrində ətriyyət sənyəsi üçün yararlı müxtəlif aromati efir yağları vardır. Milax, Qazançı, Sultanbut ərazilərində, Kola, Duman, Tillək və Batabat meşələrində yayılmışdır.

Acımtıl yalançı cırə – *Pimpinella peucedanifolia* Fisch. ex Ledeb. Atropatan coğrafi tipinə mənsub olan çoxillik bozumtul, mezokserofit bitkidir. Gövdəsi 40-50, 60-80 sm hündürlükdədir, qısa tükcüklü və göyümtüldür. Yarpaqları üçbucaqşəkilli, üç dəfə ikiqat lələkvari, sərt neştərvanı-pazşəkilli, 2-3 parçalı seqmentlidir. Çətiri (3)5-8 şüalıdır, çətircik 8-15 çiçəklidir, ləçəkləri ağdır. Subalp qurşağın qaya və çəmənlərində yayılmışdır. İyul-avqust aylarında çiçəkləyir və meyvə verir. Azərbaycanda ancaq Naxçıvan MR-də (2000-2400 m), çəmənlərdə, kolluqlar arasında, qayalıqlarda yayılmışdır. Şahbuz rayonunun Küküdağ və Qanlıgöl ətrafındakı çəmənlərdə rast gəlinir. Qarabağdan təsvir olunmuşdur.

Qatışıq yalançı cırə – *Pimpinella pseudotragium* DC. (*P. confusa* Woronow). Çoxillik bitkidir. Çoxbaşıqlı kökümsovu vardır. Əsasından köhnə yarpaq saplaqlarının qalıqları ilə sıx əhatə olunmuşdur. Gövdəsi düz, nazik, silindrik, zolaqlı və budaqlıdır, (23) 30-80 sm hündürlükdədir. Kökətrafi yarpaqları çoxsaylı olub, uzun saplaqlıdır. Çətiri (6) 8-15 şüalıdır, 10-20 mm uzunluqdadır. Ləçəkləri təmiz ağdır və ya çəhrayıdır. Xaricdən yumşaq tükcüklüdür, meyvəsi yumurtavardır yaxud yumurtavari-uzunsovdur, 2-3 mm uzunluqdadır. May-avqust aylarında çiçəkləyir və meyvə verir. Azərbaycanda – Qobustanda, Böyük Qafqazın şərqində, Kiçik Qafqazın mərkəzi və cənub hissəsində (Zəngilan), Naxçıvan MR-in dağlıq ərazilərində, orta dağ qurşağında, nadir halda aşağı dağ qurşağında – qayalı, daşlı yamaclarda, daşlı çöküntülərdə, dağ çəmənlərində və bağlarda rast gəlinir. Azərbaycan florasında Naxçıvan MR ərazisi üçün göstərilməyən 3 növ *P. grossheimii* Schischk. – Qrossheyim yalançı cırası, *P. aromatica* Bieb. – Ətirli y.c. və *P. affinis* Ledeb. – oxşar y.c. geobotaniki tədqiqatlar zamanı bu ərazidə axtarılmışdır. Nəticədə, *Pimpinella aromatica* Bieb. və *P. affinis* növləri Ə.Ş.İbrahimov və N.P.Mehdiyeva tərəfindən 1984-cü ildə yeni aşkar edilmişdir. Onların efir yağı öyrənilmiş və yeyinti sənayesində sınaqdan keçirilərək müsbət rəy alınmışdır. Ancaq onların əsas ocaq sahələri, təbii ehtiyatı, introduksiyası və digər əsas məsələlər həll olunmamış qalmışdır.

Pəmbəli yalançı cırə – *Pimpinella puberula* DC. növü 1985 və 1986-cı illərdə tədqiqatlar zamanı tərəfimdən aşkar olunaraq Naxçıvan MR florasına daxil edilmişdir [3, s. 157-158]. Cinsdə bəzi növdaxili dəyişikliklər edilmişdir. *P. affinis* Ledeb. – *P. peregrina* L. növünə, *P. confusa* Woronow isə *P. pseudotragium* DC. növünə birləşdirilmişdir. *P. pseudotragium* DC. və *P. puberula* (DC.) Boiss. növünün Qafqaz florasında olub-olmaması ciddi mübahisəyə səbəb olmuşdur. Belə ki, İ.L.Karyagin *Pimpinella* L. cinsini işləyərkən, onu Qafqaz, Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan floralarında verməmişdir. Hansı ki, N.Sveylov, T.Yeqorov və S.K.Çerepanov bu növü 23.VI 1956-cı ildə Ordubad rayonunun Dastə kəndi ətrafından topladıqlarını bildirmişdilər. N.P.Mehdiyeva, Ə.Ş.İbrahimov və F.A.Əhməd-zadə tərəfindən 1983-cü ilin iyul ayında Şərur rayonunun Qıvrıq kəndi ərazisində növün aşkar edilməsi, onun Azərbaycanda olmasını təsdiq etdi. 1984-cü ildə *P. puberula* (DC.) Boiss. axtarışı Düzə, Xok, Şahtaxtı, Böyük-düz, Yurduç, Şəkərabad, Yarımcə, Şıxmahmud və Cəhri kəndləri ətrafında yayılması müəyyən olunmuşdur [8, s. 19-20; 9, s. 86-91].

Açıqrəng yalançı cırə – *Pimpinella rhodantha* Boiss. Kiçik Asiya-Qafqaz coğrafi tipinə mənsub olan çoxillik mezofit bitkidir. Hündürlüyü 20-80 (100) sm-ə qədər, az budaqlanan, tükcüklü və ya tükcüksüz ot bitkisidir. Yarpaqları lələkvarıdır, alt yarpaqların seqmentləri dərin kəsilməli, qanadlı, üst yarpaqların seqmentləri isə neştərvanı və ya xəttidir. Çətir şüaları 15-20-dir, çiçəkləri çəhrayıdır. Subalp və alp qurşaqlarında çəmənlərdə və kolluqlarda rast gəlinir. Meyvəsi çılpaqdır, yumurtavardır, 2,5 mm-ə qədər uzunluqdadır. Ləçəkləri parlaq çəhrayı-qırmızıdır, nadir halda solğun çəhrayı və ya ağ

rəngdədir. Kiçik Asiyada, İranda vardır. Naxçıvan MR-də subalp və yuxarı meşə qurşaqlarında yayılmışdır. Əsasən çəmənlərdə, meşə sahələrində, meşə talalarında rast gəlinir. İyul ayında çiçəkləyir, avqust-sentyabr aylarında meyvələri yetişir. Böyük Qafqazda, Kiçik Qafqazda, Naxçıvan MR-in dağlıq ərazilərində: Nəhrəmdağ, Dardağ, Berdikdağ ətrafında yayılmışdır. Skandinaviyada, Orta Avropada, İranda və Türkmənistanda vardır.

Daşdələn yalançı cırə – *Pimpinella saxifraga* L. Qərbi Palearktik coğrafi tipinə mənsub olan, çoxillik mezofit bitkidir. Gövdəsi şırımlıdır, 25-60 sm hündürlükdədir. Aşağı yarpaqları lələkşəkilli, yumurtavari, yaxud girdə, çılpaq və ya damar boyu yumşaq tükcüklü yarpaqlıdır. Yuxarı yarpaqları lələkvari və ya ikiqat lələkvari parçalıdır. Çətiri 6-12 şüalıdır, ləçəkləri ağdır. Subalp və alp qurşaqlarının çəmənlərində yayılmışdır. İyul-avqust aylarında çiçəkləyir və meyvə verir. Böyük Qafqazda, Kiçik Qafqazda, Naxçıvan MR-in dağlıq ərazilərində, xüsusilə Qaraqış, Gəlinqaya, Qaraqüzey, Keçəltəpə, Aracıq, Dəmirli, Soyuq və Qapıcıq dağları ərazilərində yayılmışdır. Skandinaviyada, Avropada, Balkan-Kiçik Asiyada və İranda vardır.

Daşdələn yalançı cıranın meyvə və köklərindən tibbi məqsədlə istifadə olunur. Köklərində 0,1-0,4% efir yağı və furokumarinlər (pimpinellin, izopimpinellin, berqapten) müəyyən edilmişdir. Meyvələrinin tərkibində 1,6-3%-ə qədər efir yağı vardır ki, bunun tərkibindəki aromatik birləşməli terpenoidlər ona ətirli qoxu verir. Ətirli cıraqülü meyvələrinin tərkibi 90% anetoldən ibarətdir. Daşdələn yalançı cıranın köklərindən və meyvələrindən hazırlanan sulu dəmləmə, bişirmə, tinktura və duru ekstrakt tənəffüs yollarının iltihabında yumşaldıcı, antiseptik və bəlgəmgətirici öskürək dərmanı kimi, eləcə də mədə-bağırsaq və böyrək xəstəliklərində iltihab qarşı istifadə olunur. Bundan əlavə meyvələrinin çayı sidıqovucu və daşsalıcı vasitə kimi işlədilir. Köklərinin spirtli çıxarışı (cövhəri) su ilə durulaşdırılaraq boğaz ağrıları və anqina zamanı qarqara edilir.

Zirəhli yalançı cırə – *Pimpinella squamosa* Karjag. Atropatan coğrafi tipinə mənsub olan çoxillik kserofit bitkidir. Gövdəsi incədir, 30-60 sm hündürlükdədir, kökətrafi yarpaqları sadə lələkvari 2-3 cüt yarpaqcıqlı, aşağı cüt saplaqlı, qalanları oturaqdır. Çətiri 5-8, çətirciyi 10-15 şüalıdır, ləçəkləri ağdır. İyun-iyul aylarında çiçəkləyir, avqust ayında meyvə verir. Azərbaycanda ancaq Naxçıvan MR-də yayılıb. Orta dağ qurşağının qayalı və daşlı yamaclarında rast gəlinir, çox nadirdir. Ermənistandan (Dərələyəz) təsvir edilib. Naxçıvan MR-də Çalxanqala (Əznəbürd) ətrafından, Nəhrəm-Dərəşəmdan, Arpaçay dərəsəsinin ətraf qayalıqlarından, Ardıcadağdan və Lixbirt dərəsindən toplanılmışdır.

Qatışıq yalançı cırə – *Pimpinella confusa* Woron. Çoxillik bitkidir, (23) 30-80 sm hündürlükdədir. Çətiri (6) 8-15 şüalıdır. Tərkibindəki efir yağları digər növlərdə olduğu kimi ətriyyatda, kosmetika sənayesində, məişətdə və xalq təbabətində istifadə olunur.

Cırə növlərinin yayıldığı sahələr botaniki, geobotaniki və bitki ehtiyatını hesablama aparılan tədqiqatlarda müəyyənləşdirilmiş, məhsuldarlığının, ehtiyatının hesablanmasında A.L.Ştereyin və b. [11, s. 51] metodikasından istifadə edilmişdir (cədvəl 1).

Beləliklə, aparılan tədqiqatlar nəticəsində Naxçıvan MR ərazisində cinsin 12 növünün olduğu daqiqləşdirilmişdir. *P. confusa* Woronow ərazi florasına yeni əlavə olunmuşdur. Yalançı cırə növləri qiymətli efir yağlı bitkilərdir. Azərbaycanın Karavizkimiləri tədqiq etmiş S.C.İbadullayeva [1, 2, s. 159] Naxçıvan MR ərazisində yayılmış yalançı cırə cinsinin 8 növünün efir yağının faizlə miqdarını müəyyən etmişdir: *Pimpinella saxifraga* L. 2,95 ± 0,70; *P. rhodantha* Boiss. 0,93 ± 0,050; *P. squamosa* Karjagin. 5,80 ± 0,349; *P. antriscoides* Boiss. 0,94 ± 0,050; *P. pseudotragium* DC. 4,63 ± 0,274; *P. aromatica* Bieb. 8,70 ± 0,511; *P. affinis* Ledeb. 3,26 ± 0,198; *P. peucedanifolia* Ledeb. 0,65 ± 0,043.

Yalançı cira növlərinin təbii ehtiyatı

Rayonlar	Ümumi sahə, ha	1 ha-da bitkilərin sayı	1 bitkilənin orta yaş çəkisi q.	Məhsuldarlıq, 1 ha/kq	Təbii ehtiyat, t.		
					Bioloji ehtiyat	İstismar ehtiyatı	İllik tədarük həcmi
Sədərkək	710	420	465	195,3	138,66	83,20	4,16
Şənur	1270	650	561	364,65	463,11	277,87	13,89
Kəngərli	735	398	659	262,28	192,78	115,67	5,79
Babək	1340	783	640	501,12	671,50	402,9	20,15
Şahbuz	986	878	768	674,30	664,86	398,92	19,95
Culfa	1100	690	574	396,06	435,67	261,40	13,07
Ordubad	840	914	672	614,21	515,94	309,56	15,48
Cəmi:	6981	4731	4340	3007,9	3082,5	1849,5	92,48

Efir yağları bir çox sənaye sahələrində: kosmetik, ətriyyat, yeyinti, qənnadı, çörəkbişirmə, sabunbişirmə, spirtsiz içkilər, likör-araq, tibb və s. istifadə edilir. Yeni təbii sahələr isə "Fitoterapiya" və "Aromaterapiya"dır [1, s. 13-24]. İlk dəfə fransız alimi Rene-Moris Hattefos "aromaterapiya" sözünü işləmişdir. Bu təbii ehtiyatımıza: efir yağlarından karamel-şirniyyat, sərinləşdirici içkilər, maye yuyucu vasitələr, hava təmizləyici aerosollar, diş pastaları, müxtəlif ətirli kremlər, sabunlar, mədə-bağırsaq xəstəliklərinə qarşı həblər, məlhəmlər, ətirilər və digər çoxsaylı məhsulların istehsalı aiddir.

Yalançı cira növlərinin təbii sahələrinin çoxluğunu, istehsalatda efir yağlarına tələbatın artdığını nəzərə alaraq, rayonlar üzrə onların ümumi sahəsi, məhsuldarlığı müəyyən edilmiş və təbii ehtiyatı (bioloji, istismar, illik tədarük həcmi) hesablanmışdır.

Təklif və tövsiyələr

1. Tərkiblərində efir yağının miqdarı kifayət qədər yüksək olan: Ətirli yalançı cira – *Pimpinella aromatica* Bieb., Qatışıq y.c. – *P. pseudotragium* DC., Daşdalan y.c. – *P. saxifraga* L., Oxşar y.c. – *P. affinis* Ledeb. növlərinin tədarükü, emalı və tətbiqi;
2. Adi y.c. – **Pimpinella anisum* L., Ətirli y.c. – *P. aromatica* Bieb. və Qatışıq y.c. – *P. pseudotragium* DC. növlərinin introduksiya yolu ilə mədəni kulturaya keçirilməsi, geniş miqyasda ekilib-becərilməsi;
3. Zirehli y.c. – *Pimpinella squamosa* Karjagin, Ətirli y.c. – *P. aromatica* Bieb., Oxşar y.c. – *P. affinis* Ledeb. və Pəmbəli y.c. – *P. puberula* (DC.) Boiss. növləri Cənubi Qafqazda ancaq Naxçıvan MR ərazisində yayıldığından qorunması təklif və tövsiyə olunur.

ƏDƏBİYYAT

1. İbadullayeva S.C., Cəfərli İ.Ə. Efir yağları və aromaterapiya. Bakı: Elm, 2007, 115 s.
2. İbadullayeva S.C. Azərbaycan florasının Karavizkimaları. Bakı: Elm, 2004, 321 s.
3. Talibov T.H., İbrahimov Ə.Ş. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasının taksonomik spektri // Naxçıvan: Ədəmi, 2008, 350 s.
4. Гроссгейм А.А. Определитель растений Кавказа. Москва, 1949, с. 747.
5. Гурвич Н.Л., Гаджиев И.Ю. Дикорастущие эфиромасличные высокорослой части Абракунисского района НАХ. АССР // Труды БИН АЗФАН, 1938, т. 3, с. 137-165.
6. Дамиров И.Ф., Прилипко Л.И., Шукоров Д.З., Керимов Ю.Б. Лекарственные растения Азербайджана. Баку: Маариф, 1982, 318 s.

7. Конспект флоры Кавказа. Санкт-Петербург: Товарищество научных изданий КМК, 2008, том III (1), с. 85-88.
8. Мехтиева Н.П., Ибрагимов А.Ш., Ахмед-заде Ф.А. О распространении *Pimpinella puberula* (DC.) Boiss. в Азербайджане // Известия Академии Наук Азербайджанской ССР. Серия биологических наук, 1985, № 2, с. 19-20.
9. Мехтиева Н.П., Ибрагимов А.Ш. *Pimpinella affinis* Ledeb. и *P. aromatica* Bieb. – новые виды для флоры Нах. АССР // Деп. ВИНТИ, Баку, 1986, № 3402, с. 86-91.
10. Флора Азербайджана. Баку: Академия наук Азербайджанской ССР, 1955, Т. VI, 540 с.
11. Шретер А.И. и др. Методика определения запасов лекарственных растений. Москва: Медицина, 1986, 51 с.

Алияр Ибрагимов

РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ЗАПАСЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДОВ БЕДРЕНЦА НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ

В статье приводятся сведения о широко распространенном и одном из ценных эфиромасличных растений *Pimpinella* L. в Нахчыванской Автономной Республике. Семейство *Apiaceae* Lindl. распространено в средней и верхней горных зонах в групповой форме. Биологические активные компоненты в его составе, особенно эфирные масла, показали, что этот вид можно применять в производстве. Нами выявлена общая площадь и количество эфирного масла. Определены продуктивность и запасы сырья (биологические, эксплуатационные, размер ежегодных запасов) и показана область их применения.

Ключевые слова: семейства, род, вид, бедронец, эфирное масло, ресурс, эксплуатация.

Aliyar Ibrahimov

DISTRIBUTION, STOCKS AND USE OF THE PIMPERNEL SPECIES OF THE NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC

The article provides information about one of the valuable ether oil plants *Pimpinella* L. widespread in the area of Nakhchivan Autonomous Republic. The represents of the family of *Apiaceae* Lindl. have been spread on the plant types of the foothills, plain area of middle and upper mountain zones. The biological active components in the content, especially ether oil, show that this species can be applied in production. During the investigation have been studied the main spread area, modern condition, abundance, speed of come across, the role in phytocenosis, wet weight with experimental way, the amount of ether oil, biological and ecological conditions. The productivity and stocks of raw materials (biological, operational, annual stock size) are determined and the area of their application is shown.

Keywords: family, genus, species, pimpinella, etheric oily, reserve, exploitation.

(Akademik Təriyel Talibov tərəfindən təqdim edilmişdir)