

Udk 631.47.48

GÖYGÖL MİLLİ PARKININ OT BİTKİLƏRİNİN NÖV TƏRKİBİ VƏ FİTOKÜTLƏSİ

A.E.ƏLİYEVƏ

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Hidrometeorologiya ET İnstitutu

Məqalədə Göygöl Milli Parkının dağ-meşə qəhvəyi, dağ-meşə qonur torpaqlarının təbii biotoplarında (ağacaltı) ot bitkilərinin növ tərkibi öyrənilmişdir. Həmin biotoplarda təbii ot bitkilərinin kütləsi (1m²) ölçülmüşdür. Müqayisəli olaraq növ tərkibinə daxil olan bitkiləri ayrı-ayrı ailələrə görə ayırmışdır.

Açar sözlər: Biotop, torpaq, növ, fitokütlə

Ölkəmizdə biomüxtəlifliyin qorunması məqsədilə bir çox Milli Parklar yaradılmışdır. Bunlardan biri də Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacında yerləşən Göygöl Milli Parkıdır. Göygöl Milli Parkı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə 01 aprel 2008-ci ildə 12755 ha sahədə yaradılmışdır. Milli Parkın bioloji müxtəlifliyi olduqca zəngindir. Belə ki, bu ərazidə formalaşan meşələr növ tərkibinə, onların tutduqaları sahə və ağacların taksasiya göstəricilərinə görə müxtəlifdir. Burada çoxlu sayda ağac və kol növlərinə rast gəlinir. Ağaclara əsasən Şərq fıstığı (*Fagus orientalis*), adi göyrüş (*Fraxinus excelsior*), cökə (*Tilia caucasica*), qaraçöhrə (*Taxus bacata*), qarmaqvari şam (*Pinus hamata*), alçaqboylu ardıc (*Juniperus depressa*), Şərq palıdı (*Quercus orientalis*), tozağacı (*Betul litvinowii*) və s.; kollardan zoğal (*Cornus mas*), zirinc (*Berberis iberica*), əzgil (*Mespilus caucasica*), gərməşov (*Evenymuseuropae*), böyürtkən (*Rubus idaeus*) və s. üstünlük təşkil edir [1].

Eyni zamanda vizual tədqiqat zamanı o da məlum oldu ki, əsas meşə əmələgətirən ağaclar fıstıq, palıd, şam və vələsdir. Digər cinslər cökə, qarağac, quşarmudu və s. ağacların tərkibində qarışıq halda bitirlər. Göygöl Milli Parkının ot örtüyü də rəngarəng və zəngin təbiətə malikdir. Bitki örtüyü, xüsusilə də meşələr ən zəngin üzvi aləmdir. Məlum olduğu kimi, torpaq əmələgəlmə prosesində, torpaq çürüntüsünün formalaşmasında və torpaqların eroziyadan mühafizə olunmasında ot bitkiləri çox böyük rol oynayır. Torpaqda üzvi maddənin yaranması bitki qalıqlarının parçalanması və humifikasiya hesabına baş verir.

Meşə ekosisteminin bitki örtüyünün qalıqları torpaq canlıları tərəfindən çevrilərək dağ-meşə qəhvəyi və dağ-meşə qonur torpaqların münbitliyini formalaşdırır. Bitki qalıqlarının tərkibində olan mineral, üzvi maddələr bioloji dövranə daxil olur. Beləliklə, meşə biogeosenozu öz fəaliyyətini davam etdirir.

Bizim məqsədimiz Göygöl Milli Parkında tədqiq edilən torpaqlarınağacaltı ot bitkilərinin növ tərkibini və fitokütləsini öyrənməkdir. Digər tərəfdən

Göygöl Milli Parkında ekoloji təsirlərin nəticəsi və təbii fitosenozunda baş verən dəyişiklikləri öyrənməkdən ibarət olmuşdur. Bu da növ müxtəlifliyinin qorunması üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir [3].

Tədqiqat obyektı və metodika. Tədqiqat Kiçik Qafqazın şimal şərqində yerləşən Göygöl Milli Parkının təbii meşə fitosenozunda aparılmışdır. Tədqiqat obyektı burada yayılan dağ-meşə qəhvəyi və dağ-meşə qonur torpaq tiplərindən seçilmiş təbii biotoplarında götürülmüşdür. Eyni zamanda tədqiqat işinin aparılmasında V.C.Hacıyevin, İ.S.Səfərovun, K.K.Əsədovun, T.O.İbrahimovun və s. alimlərin tədqiqatlarından istifadə olunmuşdur. Bitki növlərinin təyinatında məlum olan flora, konspekt və təyinedicilərdən istifadə edilmişdir [2, 4, 7]. Tədqiqat olunan ərazidən toplanmış bitkilərdən herbarilər hazırlanmış və laboratoriya şəraitində təyin edilmişdir.

Alınmış nəticələrin təhlili. Aparılan tədqiqat zamanı ilkin olaraq 29 herbari nümunəsi hazırlandı. Ot bitkilərin yerüstü kütləsinin ölçülməsi seçilmiş biotopda 1m² sahədən aparılmışdır [5]. Toplanan herbarilərə əsasən təyin edilən bitkilərin növ tərkibi aşağıdakı cədvəldə verilmişdir (cədvəl 1).

Cədvəl 1.
Göygöl Milli Parkından götürülmüş ot bitkilərinin növ tərkibi


№	Latınca adlar	Azərbaycanca adlar	Rusca adlar
1	Fəsilə: <i>Orchidaceae</i> Juss Cins: <i>Epipactis</i> Zinn Növ: <i>E. palustris</i> (L.) Crantz	Səhləbçiçəklilər Mürşəg otu Batdaxlı m.	Ятрышники вые Дремлик Д. болотный
2	Fəsilə: <i>Brassicaceae</i> Burnett Cins: <i>Aethionema</i> R.Br Növ: <i>Ae. sp</i>	Kələmçiçəklilər Pulcuqluot Ae.sp	Капустные Крылотычи нник К.сп
3	Fəsilə: <i>Polygonaceae</i> Lindl. Cins: <i>Rumex</i> L Növ: <i>R. sp</i>	Qırıbuğumkimilər Əvəlik R.sp	Гречишные Щавель Щ.сп
4	Fəsilə: <i>Fabaceae</i> Lindl. Cins: <i>Securigera</i> DC Növ: <i>S.varia</i> (L) Lassen <i>Coronilla varia</i> L	Paxlahlılar Qılıncılı ot Ala q.o.	Бобовые Секуригера С.пестрый

5	Fəsilə: <i>Asteraceae</i> Dumort Cins: <i>Artemisia</i> L Növ: <i>A. absinthium</i> L	Asterçəkililər Yovşan Acı y.	Астроцветные Польнь П. горькая
6	Fəsilə: <i>Thymelaeaceae</i> Juss. Cins: <i>Daphne</i> L Növ: <i>D. glomerata</i> Lam	Canavargiləsikimilər Canavargiləsi Koma C	Волчниковые Волчник В. скупенный
7	Fəsilə: <i>Ranunculaceae</i> Juss Cins: <i>Thalictrum</i> L Növ: <i>T. foetidum</i> L	Qaymaqçəkililər Qaytarma İyli q	Лютиковые Василистник к В. воночий
8	Fəsilə: <i>Caryophyllaceae</i> Juss Cins: <i>Silene</i> L Növ: <i>S. sp</i>	Qərənfilçəkililər Quzuqulağı S. sp	Гвоздичные Смолевка С. сп
9	Fəsilə: <i>Rosaceae</i> Juss Cins: <i>Alchimilla</i> L Növ: <i>A. sp</i>	Gülçəkililər Şahduran A. sp	Розоцветные Манжетка М. сп
10	Fəsilə: <i>Lamiaceae</i> Lindl Cins: <i>Salvia</i> L Növ: <i>S. sp</i>	Dalamazkimilər Sürvə S. sp	Яснотковые Шалфей Ш. сп
11	Fəsilə: <i>Campanulaceae</i> Juss Cins: <i>Campanula</i> L Növ: <i>C. sp</i>	Zəngiçəyikimilər Zəngiçəyi C. sp	Колокольчиковые Колокольчик К. сп
12	Fəsilə: <i>Primulaceae</i> Vent Cins: <i>Primula</i> L Növ: <i>P. auriculata</i> Lam	Novruzçəyikimilər Novruzçəyi Qanadıqlı n	Первоцветные Первоцвет П. ушастый
13	Fəsilə: <i>Labiataceae</i> R.Br Cins: <i>Lobelia</i> L Növ: <i>L. erinus</i> L	Firəngotukimilər Firəngotu Adi f	Лобелиевые Лобелия Л. обьковенная
14	Fəsilə: <i>Scrophulariaceae</i> Juss Cins: <i>Veronica</i> L. Növ: <i>V. sp</i>	Qurdağzıçəkililər Bulaqotu V. sp	Норичниковые Вероника В. сп
15	Fəsilə: <i>Euphorbiaceae</i> Juss Cins: <i>Euphorbia</i> L Növ: <i>E. sp</i>	Südləyənkimilər Südləyan E. sp	Молодайе Молодай М. сп
16	Fəsilə: <i>Valerianaceae</i> Batsch Cins: <i>Valeriana</i> L Növ: <i>V. leucophala</i> DC	Pişikotukimilər Pişikotu Küləng pişikotu	Валериановые Валериана В. пепельно-серая
17	Fəsilə: <i>Geraniaceae</i> Juss Cins: <i>Geranium</i> L Növ: <i>G. sp</i>	Ətirşahçəkililər Ətirşah G. sp	Гераниевые Герань Г. сп
18	Fəsilə: <i>Boraginaceae</i> Juss Cins: <i>Symphytum</i> L Növ: <i>S. sp</i>	Göyşəbankimilər Xəndəkotu S. sp	Бураниковые Окопник О. сп
19	Fəsilə: <i>Rosaceae</i> Juss Cins: <i>Potentilla</i> L Növ: <i>P. sp</i>	Gülçəkililər Qaytarma P. sp	Розоцветные Лапчатка Л. сп
20	Fəsilə: <i>Fabaceae</i> Lindl Cins: <i>Onobrychis</i> Mill Növ: <i>O. sp</i>	Paxlalılar Xaşa O. sp	Бобовые Эспарцет Э. сп
21	Fəsilə: <i>Scrophulariaceae</i> Juss Cins: <i>Rhinanthus</i> L Növ: <i>R. sp</i>	Qurdağzıçəkililər Çınqılıqotu R. sp	Норичниковые Погремок П. сп
22	Fəsilə: <i>Caryophyllaceae</i> Juss Cins: <i>Silene</i> L Növ: <i>S. conica</i> L	Qərənfilçəkililər Quzuqulağı Sivri q	Гвоздичные Смолевка С. коническая
23	Fəsilə: <i>Lamiaceae</i> Lindl Cins: <i>Nepeta</i> L Növ: <i>N. sp</i>	Dalamazkimilər Pişikənəsi N. sp	Яснотковые Котовник К. сп
24	Fəsilə: <i>Rosaceae</i> Juss Cins: <i>Fragaria</i> L Növ: <i>F. viridis</i> (Duch)-weston	Gülçəkililər Çiyələk Göy ç	Розоцветные Земляника З. зеленая
25	Fəsilə: <i>Convolvulaceae</i> Horan Cins: <i>Polygonatum</i> Hill Növ: <i>P. glaberrimum</i> C. Koch	İnciçəyikimilər Güyənə Hamar g	Ландышевые Купена Гладкая к.
26	Fəsilə: <i>Lilaceae</i> Juss Cins: <i>Lilium</i> L Növ: <i>L. szovitsianum</i> Fitch	Zanbaqçəkililər Zanbaq Şoviç z.	Лилейные Лилия Л. шовица

27	Fəsilə: <i>Dryopteridaceae</i> R C. Ching Cins: <i>Dryopteris</i> Adans- Növ: <i>D. filix-mas</i> (L) Schott	Ayıldəşəyilər Ayıldəşəyi Erkək a.	Папоротниковый Щитовник Мужской щ.
28	Fəsilə: <i>Sambucaceae</i> Batsch ex. Borkh Cins: <i>Sambucus</i> L Növ: <i>S. ebulus</i> L	Kəndələşkimilər Gəndələş Otvəri g.	Бузиновы Бузина Б. травянистая
29	Fəsilə: <i>Fabaceae</i> Lindl Cins: <i>Lathyrus</i> L Növ: <i>L. miniatus</i> Bieb. ex Stev	Paxlalılar Gülülçə Kiçik g.	Бобовые Чина Ч. киноварная

Təbii fitosenoz herbarisinin növ tərkibinin dəqiq-ləşdirilməsi göstərdi ki, material 29 növdən ibarətdir, onları da öz növbəsində: müxtəlif ot bitkilərinə daxil olan, paxlalılar, mürəkkəbçəkililər, səhləbçəkililər və s. təşkil edir.

Eyni zamanda Milli Parkda olan dağ-meşə qəhvəyi və dağ-meşə qonur torpaqlarında ot bitkilərinin yerüstü fitokütlə ehtiyatı təyin edilmişdir. Əvvəlcə toplanmış bitki kütləsinin nəm halda çəkisi ölçülmüş, daha sonra isə laboratoriya şəraitində qurularaq, bitkilərin quru çəkisi müəyyən edilmişdir. Alınan nəticələr aşağıdakı şəkildə göstərilmişdir.



Şəkil. Dağ-meşə qəhvəyi və dağ-meşə qonur torpaqlarının ot bitkilərinin yerüstü fitokütləsi.

Şəkildən də göründüyü kimi, 1915m hündürlükdə zəif inkişaf etmiş ot sahəsinin nəm çəkisi 1300 qr/m² olduğu halda, qurudulduqdan sonra 250 qr/m², 1836 m hündürlükdə orta inkişaf etmiş ot sahəsində nəm çəki 1955 qr/m², qurudulduqdan sonra 370 qr/m², 1602 m hündürlükdə yaxşı inkişaf etmiş sahədə nəm halda çəki 2610 qr/m² olduğu halda, qurudulduqdan sonra 495 qr/m² olduğu müəyyən edilmişdir.

Zəif inkişaf etmiş ot sahəsinin GPS koordinant nöqtəsi (166) 38T 0611373şm 4470723şərq, orta inkişaf etmiş ot sahəsinin GPS koordinant nöqtəsi (167) 38T 0611404şm 4471731şərq, yaxşı inkişaf etmiş ot sahəsinin GPS koordinant nöqtəsi isə (161) 38T 0612681şm 4474997şərq uzunluğunda olduğu tədqiqat zamanı müəyyən edildi. Əldə edilən məlumatlara görə tədqiq edilən torpaqların nəm halda orta göstərici 1955 qr/m², quru halda isə 371 qr/m² olmuşdur.

Nəticə. 1. Tədqiqatlar göstərdi ki, təbii biotoplarda ot bitkiləri 29 cins və 29 növə aiddir. 2. Yerüstü kütlənin miqdarı tədqiq edilən dağ-meşə qəhvəyi və dağ-meşə qonur torpaqlarda müqayisəli olaraq nəm halda çəki 1300-2610 qr/m² olduğu halda, quru çəki 250-495 qr/m² arasında dəyişir.

ƏDƏBİYYAT

1. Əsədov K.S., İbrahimov T.O., Azərbaycanın Milli Parkları 2015, 336 s. 2. Əsgərov A.M. Azərbaycan florasının konspekti (əlavələr və dəyişikliklərlə, 1961-2009). Bakı, Elm2011, 204 s. 3. Məmmədov. Ekologiya, ətraf mühit və insan. "Elm" 2006.608 s Q.Ş., Xəlilov M.Y., 4. Çolak A.H., Sorger F. Türkiyə çiçəkləri. Genişletilmiş ikinci baskı.2004 Ankara: Lazer Ofset Matbaa Tesisleri San. Ve tic. Ltd.Şti. 600 s. 5. Быстрицкая Т.Л., Осычнюк В.В. Почвы и первичная биологическая продуктивность степей приазовья. Москва 1975 «Наука» 109 с. 6. Гаджиев В.Д. Динамика и производительность растительных формаций высокогорий Большого Кавказа. Баку 1974, «Элм» 102с. 7. Гроссгейм А.А. Растительные ресурсы Кавказа 1946 Баку: Изд. Азерб. ССР. 671 с. 8. Сафаров. И.С. Важнейшие древесные третичные реликты Азербайджана. Изд. АН. Азерб. ССР, Баку, 1962, 310 с.

Видовой состав и фитомасса травянистой растительности Гейгельского Национального Парка

А.Е.Алиева

В статье приводятся результаты исследований в горно -лесных коричневых и горно -лесных бурых почвах. На естественных биотопах были определены 29 видный травянистой растительности, также надземная фитомасса изучаемых биотопов.

Ключевые слова: биота почва, вид, фитомасса

Species composition and phytomass of grass plants in the Goygol National Park

A.E.Aliyeva

This article presents the results of the research in mountain-forest brown and mountain-forest soils. On natural biota 29 species of herbaceous vegetation have been determined and the aboveground phytomass of the biotopes has been also determined.

Key words: biota, of the soil, species, phytomass

aysel.aliyeva3040@bk.ru