

NEFTÇALA RAYONU ƏRAZISİNDƏ ÇƏMƏN-BOZ TORPAQLARIN AQROEKOLOJİ SƏVİYYƏSİ

Əhmədova G.M., Səlimova P.S.

*Bakı Dövlət Universiteti
sulsal@mail.ru*

Neftçala rayonu ərazisində suvarılan çəmən-boz torpaqların aqrokimyəvi xüsusiyyətləri öyrənilmiş, məlum olmuşdur ki, bu torpaqlar Respublika torpaqları üçün qəbul edilmiş qradasiyaya uyğun olaraq azot, fosfor və kaliumun bitki tərəfindən mənimsənilən formaları ilə əsasən zəif təmin olunmuşlar.

Müasir dövrdə kənd təsərrüfatı sahəsinin qarşıda duran əsas vəzifələrdən biri, kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığını artırmaq və əkin sahələrini genişləndirməkdən ibarətdir. Hələ qədim dövrlərdən bu zamana kimi intensiv istifadə edilən torpaqların münbitliyinin artırılması və əkin altında istifadə olunan torpaqların əsaslı surətdə keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması yollarının öyrənilməsi aktual məsələlərdəndir.

Boz-çəmən və çəmən-boz torpaqlar Muğan düzünün torpaq örtüyünün əsas fondunu təşkil edir. Geomorfoloji cəhətdən bu torpaqlar ilin müəyyən hissəsində yüksək rütubətlik şəraitini qoruyan maili şleyfləri, sıx-sıx depressiv alçaqlıqları əhatə edir. Bu torpaqlar torpaqlar yarımhidromorf rejim şəraitində inkişaf etmişdir və buna görə də, torpaqəmələgəlmə prosesi səthi və qunt rütubətliyiylə təsiri altında baş verir. Bu torpaqların morfologiyası üçün profildə hidromorfizmin bəzi xassələrinin mövcudluğu səciyyəvidir, bu isə həmin torpaqların subasar delta rejimi şəraitində yerləşdiyini göstərir.

Neftçala rayonu ərazisində formalaşmış torpaqlarının əsas genetik növləri mövcud bioklimatik qurşaqlqlarla şərtlənmişdir. Neftçala rayonu ərazisində boz torpaqlar geniş inkişaf etmişdir. Bataqlıqlaşmış yerlərdə çəmənlik-bataqlı torpaqları müşahidə olunur. Neftçala rayonu ərazisində suvarılan çəmən-boz torpaqlarında əsas qida maddələrinin ümumi miqdarının çox olmasına baxmayaraq bitki tərəfindən mənimsənilə bilən qida maddələrinin miqdarı azdır.