

İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLERDƏ NADİR GEOFITLƏRİN QORUNMASI

Dadaşova L.K.

Təhsil Nazirliyi Respublika Uşaq-Gənclər İnkişaf Mərkəzi
lala_eko@mail.ru

Azərbaycan florasının bioloji müxtəlifliyi öz unikal zənginliyi ilə bütün dünyada məşhurdur. Qafqaz regionunda bir çox nadir və endemik bitki növlərinin məhz bu ərazidə məskunlaşması esrlər boyu formalaşmış 8 iqlim tipinin təsiri altında davam edən takamül prosesinin nəticəsidir. Müasir dövrdə təbii landsaftlara antropogen təsirin güclənməsi nadir geofit bitkilərin məhdud saylı lokalitetlərinə mənfi təsir göstərir. İnsanlığa qarşı ən ağır cinayət olan hərbi təcavüz zamanı flora və faunaya qarşı ekoloji terrorun fəsadları təbiətə ən ağır zərərdir.

Zəfərli yurduumuzun təbiət gözəllikləri ilə zəngin olan təkrarolunmaz bitki örtüyünün işğaldan azad ərazilərdə illər boyu ekoloji vandalizmə, hərbi müdaxiləyə və düşmən tapdağına məruz qalması ciddi narahatlıq doğurur. İşğaldan azad edilən qədim torpaqlarımızda bioloji müxtəlifliyinin öyrənilməsi və bərpası bu günün aktual məsələlərindən biridir. Hazırda bitki örtüyünün öyrənilməsi və bərpası istiqamətində mühüm elmi-tədqiqat, monitoring işləri həyata keçirilir.

Həmin ərazilərdə müxtəlif illərdə tədqiqatçılar tərəfindən qeydə alınmış nadir geofit bitkilərdən *Tulipa* L. və *Iris* L. növlərinin hazırkı durumunun tədqiq olunması əhəmiyyətlidir. Ölkəmizdə 9 dağlaləsi və 25 süsən növünə təsadüf edilir. Azərbaycanın "Qırmızı Kitabı"nın (2013) ikinci nəşrinə 8 *Tulipa* L. növü və 15 *Iris* L. növü daxil edilib. 3 *Tulipa* L. növünə və 7 *Iris* L. növünə Azərbaycanın digər bölgələri ilə yanaşı azad edilmiş ərazilərdə də təsadüf edildiyi göstərilir. Qarabağ dağlaləsi – *Tulipa karabachensis* Grossh. Azərbaycanın nadir, Cənubi Qafqazın endemik növüdür. Kiçik Qafqazın mərkəzi dağ qurşağında, Şuşa ətrafında, qayalıqlarda, meşə talasında rast gəlinir. IUCN Qırmızı Siyahısına görə "Məlumat azlığı" kategoriyasına aiddir – DD. *Tulipa schmidtii* Fomin - Xocavənd, Əsgəran (Topxana), Cəbrayıl rayonu, Məzrə kəndi ətrafında qeydə alınıb. "Təhlükəli həddə yaxın olanlar" kategoriyasına aiddir – NT. (Azərbaycanın "Qırmızı kitabı", 2013). *Tulipa biebersteiniana* Shult. et Shult. – Qarabağın cənubunda, Murovdağda qeydə alınıb (Qafqaz florasının konsepti, 2006). IUCN Qırmızı Siyahısına görə "Nəslə kəsilməyə həssas olanlar" kategoriyasına aiddir – VU A2c + 3c. *Iris caucasica* Stev. (*Juno caucasica* (Hofm.) Klatt.) Qarabağın cənubunda qeydə alınıb. Azərbaycanın nadir, Qafqazın endemik növüdür. IUCN Qırmızı Siyahısına görə "Təhlükəli həddə yaxın olanlar" kategoriyasına aiddir – NT. *Iris alekseenkoi* Gross. - Murovdağın yamaclarında qeydə alınıb. Azərbaycanın nadir, Qafqazın endemik növüdür. "Kritik təhlükə həddində olanlar" kategoriyasına aiddir –

CR B2b(iii, iv, v); c(ii, iii). *Iris helena* C.Koch. – Qarabağın cənubunda, Murovdağda qeydə alınıb. *Iris iberica* Hoffm. - Murovdağın yamaclarında qeydə alınıb. "Nəslə kəsilməyə həssas olanlar" kategoriyasına aiddir – VU D2. Azərbaycanın nadir, Qafqazın endemik növüdür. *Iris pseudacorus* L. Azərbaycanın nadir növü olub, Şuşa, Zəngəzur ərazisində rast gəlinir. "Nəslə kəsilməyə həssas olanlar" kategoriyasına aiddir – VU B1ab(iii) + 2ab(iii). *Iris paradoxa* Stev. Azərbaycanın nadir, Qafqazın endemik növüdür. Qarabağda, Murovdağda rast gəlinir (A.D. Mixeyev, 2004). "Nəslə kəsilməyə həssas olanlar" kategoriyasına aiddir – VU D2. *Iris reticulata* Bieb. (*Iridodictyum reticulatum* (Bieb.) Rodionenko)) – Azərbaycanın nadir növüdür, Qarabağda, Murovdağda qeydə alınıb. "Təhlükəli həddə yaxın olanlar" kategoriyasına aiddir – NT (Qafqaz florasının konsepti, 2006).

Nadir geofitlərin toxum və vegetativ orqanlar vasitəsilə mədəni şəraitdə introduksiya bitkilərin təbiətdə reabilitasiyasına şərait yaradır. Yüksək dekorativ xüsusiyyətləri, ekoloji tolerantlığı, zəngin növmüxtəlifliyi ilə fərqlənən *Tulipa* L. və *Iris* L. növləri seleksiya işləri üçün əvəzsiz genofondur. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə bitən nadir *Tulipa* L. və *Iris* L. növlərinin nəbatət bağlarında, təcrübə sahələrində mütəxəssislərin nəzarəti altında artırılması və tükəndikləri təbii ərazilərdə reintroduksiya bitkilərin genofondunun qorunub saxlanması əhəmiyyətlidir.