

KƏLBƏCƏR RAYONU ƏRAZISINDƏ İŞGƏL DÖVRÜNDƏ MEŞƏLƏRİN SƏRHƏDDİNDƏKİ DƏYİŞKƏNLİKLƏRİN VƏ MEŞƏDAXİLİ POZUNTULARIN KOSMİK TƏSVİRLƏR VƏ CİS TEXNOLOGİYALARI VASİTƏSİLƏ ARAŞDIRILMASI

Məmmədəliyeva V.M.

*Milli Aerokosmik Agentliyi, Ekologiya İnstitutu
valide.mamedaliyeva@mail.ru*

Kəlbəcər ərazi baxımından bizim ən böyük rayonlarımızdan biridir. Kəlbəcər rayonu ərazisində sənaye əhəmiyyətli qızıl, civa, tuf, gil, perlit, üzlük daş, qum-çınqıl qarışığı, marmar, nefroid, obsidian (dəvə gözü), listvenit yataqları var. Kəlbəcərdə Yuxarı İstisu, Aşağı İstisu, Keşdək, Qarasu, Tutxun, Mozçay, Qoturlusu kimi çox böyük müalicə-balneoloji təsirə malik mineral su yataqları da yerləşir. Kəlbəcərin işğaldan azad edilməsi ilə Azərbaycanda balneoloji turizmin və mədəni sənayesinin inkişafında yeni bir mərhələ başlayacaq.

Tədqiq etdiyimiz ərazidə müxtəlif antropogen fəaliyyətlər nəticəsində ekoloji gərgin ocaqlar yaranmışdır. Belə ki, ərazinin torpaqları dağ-mədəni sənayesinin müxtəlif tullantıları, ağır metallarla daha çox çirklənməyə məruz qalmışdır. Bu da öz növbəsində ətraf mühit komponentlərinin pozulması ilə nəticələnmişdir.

Seçilən etalon ərazidə mineralların yataqları kosmik təsvirlər, ArcGIS və ENVI proqramları ilə müəyyənləşdirilmiş və kəmiyyətə qiymətləndirilmişdir. Ərazi üzrə məhv olan yaxud zədələnən meşə-bitki örtüyü aşkarlanmış və alınan nəticələrin dinamikası təyin olunmuşdur.

Arxiv materialları və CİS texnologiyaları, kosmik təsvirlərdən istifadə edərək tədqiqat ərazinin relyefi, iqlimi, hidroqrafiyası, bitki örtüyü, torpaq ehtiyatları ətraflı tədqiq olunmuş və ərazidə mövcud mineral yataqları haqqında məlumat toplanılmış və xəritələşdirilmişdir.

Tədqiqat ərazisinin DEM təsvirini SRTM peykinə əsasən ArcGIS proqram vasitəsilə hündürlük xəritəsi, Kəlbəcər rayonun ArcScene 2D vəziyyətində görüntüsü, Kəlbəcər rayon ərazisinin yamacların baharlıq (qərb) xəritəsi, Kəlbəcər rayon ərazisinin horizontlar xəritəsi, Kəlbəcər rayon ərazisinin yamacların qabarıq xəritəsi, Kəlbəcər rayon ərazisinin meyli (slope) modeli, atlas məlumat əsasında Kəlbəcər rayonu ərazisinin meşə-bitki örtüyü. Kəlbəcər rayonu torpağın temperaturasını əks etdirən xəritə, model aləti əsasında Kəlbəcər rayon ərazisinin hidroloji xəritəsinin qurulması və Kəlbəcər rayon ərazisində filiz və qeyri-filiz yataqları əks etdirən xəritə tərtib olunmuşdur.

Kəlbəcər rayonu ərazisinin müxtəlif illər üzrə meşə-bitki örtüyü (NDVI indeksi): a) 1996-cı il; b) 2006-cı il; c) 2020-cu il, Kəlbəcər rayonu müxtəlif

illər üzrə NDVI indeksin sinifləndirməsi: a) 1996-cı il; b) 2006-cı il; c) 2020-cu il, Kəlbəcər rayonun müxtəlif illərin uyğun siniflər üzrə sahə göstəriciləri (həllə): a) 1996-cı il; b) 2006-cı il; c) 2020-cu il xəritələri tərtib olunmuş. Bütün təsvirlərdən bulud olan əraziləri çıxardılmış, Kəlbəcər rayonunda uyğun siniflər üzrə sahələr (buludsuz): a) 1996-cı il; b) 2006-cı il; c) 2020-cu il hesablanmışdır.

İşğal dövründə fərdi əhatə sinifləri sahəsindəki dəyişikliklərə aid cədvəl tərtib olunmuşdur.

İşğal dövründə ərazinin müxtəlif bitki örtüyü siniflərinin kəmiyyət baxımından dəyişmələrinin, işğal zamanı bitki örtüyünün müxtəlif siniflərin sahələrinin dəyişilməsi grafikini təqdim olunur.

Tədqiqat üzrə kosmik təsvirlərin korreksiyasından alınan nəticələrdən göründüyü kimi, hər bir emal növü NDVI göstəricisinin qiymətinə təsir edir, yeni müəyyən ərazidə, məsələn 1996-cı ildə $NDVI=0,64$ -dür, bu deməkdir ki $0,5 - 0,7$ aralığında yerləşdiyindən güclü sıx bitki örtüyü (kolluqlardır), lakin atmosfer korreksiya olunduğundan sonra $NDVI=0,83$ və $0,8$ -dən yuxarı olan aralıqda olduğundan çox güclü və sıx meşə örtüyünə uyğundur.