

G SPEKTRAL SİNİFLİ HD 3794 (G8 III) VƏ HD 2942 (G8 III) ULDUZLARININ EFFEKTİV TEMPERATURLARI VƏ SƏTHLƏRİNDƏ AĞIRLIQ QÜVVƏSİ TƏCİLLƏRİNİN TƏYİNİ

Şahmarlı Z.Ə., Səmədov Z.A.

Bakı Dövlət Universiteti

shahmarlizahra@gmail.com

Ulduzların effektiv temperaturları və səthlərində ağırlıq qüvvəsi təcilləri model üsulu ilə təyin edilmişdir [1,2]. Bu üsul $[c_1]$, Q indekslərinin müşahidədən ölçülmüş və nəzəri hesablanmış qiymətlərinin müqayisəsinə əsaslanır.

Dörd rəngli, dar zolaqlı uvby fotometrik sistemində $[c_1]$ indeksi $[c_1]=c_1 - 0.2(b - y)$ düsturu ilə təyin edilir. Q indeksi UBV fotometrik sistemində aşağıdakı kimi təyin olunur: $Q = (U - B) - 0.72(B - V)$

Ulduzların effektiv temperaturları və səthlərində ağırlıq qüvvəsi təcillərinin təyində həmçinin parallaksın tətbiqi üsülündən istifadə olunmuşdur. Bu üsulun tətbiqi aşağıdakı bərabərliyin istifadəsinə əsaslanır:

$$\log g - \frac{\log M}{M_{\odot}} - 0.4BC - 4 \log T_{eff} = -10.50 + 2 \log \pi'' + 0.4mv - 0.4Av \quad (1)$$


Bərabərliyin sol tərəfini

$$\log g - \frac{\log M}{M_{\odot}} - 0.4BC - 4 \log T_{eff} = Y$$


sağ tərəfini

$$- 10.50 + 2 \log \pi'' + 0.4mv - 0.4Av = C$$

ilə işarə edək. (1) bərabərliyində π'' , m_v , A_v kəmiyyətlərinin qiymətləri kataloqlardan götürülür, bərabərliyin sağ tərəfi hesablanır, sol tərəfi dəyişən kəmiyyətdir, bura T_{eff} və $\log g$ və bu kəmiyyətlərlə bağlı $M/M_{\odot}$ və BC kəmiyyətləri daxildir. Müxtəlif T_{eff} və $\log g$ cütləri üçün təkamül əyrilərindən $M/M_{\odot}$, ulduz atmosferi modellərindən isə BC hesablanır və (1) tənliyi həll edilir: T_{eff} və $\log g$ cütləri təyin edilir. Bu cütlər $\log g - T_{eff}$ diaqramında qeyd olunur. Model və parallaksın tətbiqi üsullarla təyin olunmuş T_{eff} , $\log g$ cütləri əsasında $\log g - T_{eff}$ müstəvisində onların müxtəlif kombinasiyalarına uyğun qrafiklər qurulur. Bu qrafiklərin kəsişmə nöqtələrinə uyğun T_{eff} , $\log g$ -lərin ədədi ortası ulduzun effektiv temperaturunu və səthində ağırlıq qüvvəsinin təcilini təyin edir. Şəkil 1 və Şəkil 2-dən göründüyü kimi HD 3794 ulduzu üçün $T_{eff} = 5350$ K, $\log g = 3$; HD 2942 ulduzu üçün $T_{eff} = 5100$ K, $\log g = 2.6$ kimidir.



Şək. 1. HD 3794 ulduzu üçün T_{eff} və $\log g$ -nin təyini



Şək. 2. HD 2942 ulduzu üçün T_{eff} və $\log g$ -nin təyini

Ədəbiyyat:

1. L.S. Lyubimkov, T.M. Rachkovskaya, D.B. Poklad, Astrophysics 52, 237 (2009).
2. L.S. Lyubimkov, D. L. Lambert, S.I. Rostopchin, T. M. Rachkovskaya1 and D.B. Poklad, Mon. Not. R. Astron. Soc. 402, 1369–1379 (2010)