

XIZI ƏRAZİSİNİN MƏMƏLİ NÖVLƏRİ

¹HƏSƏNOV N.Ə., ²BÜNYATOVA S.N., ³ƏHMƏDLİ A.A.

^{1,2}AMEA Zoologiya İnstitutu, ³Bakı Dövlət Universiteti.

hasan0@bp.com, s_bunyatova@mail.ru

Abstract: As a result of research carried out in 2020-2021, 25 species of mammals were registered in the territory of Khizi. The main species of mammals belong to bats (28% - 11 species) and rodents (15% - 6 species). Five mammals have high conservation status. Common fox and common jackal are the dominant species of predators in the area. Depending on traditional migration of sheep herds the number of wolves have changed seasonally. Gazelles are very rare and individuals were released into the area in 2010. The migration of cattle and sheep has a serious impact on the fauna of large predators.

Keywords: Khizi, mammals, large predators, bats, conservation status, rodents.

GİRİŞ

Tədqiqatın məqsədi ərazidə məməlilər faunasının müasir vəziyyətini, cari teriofaunistik növ tərkibini müəyyən etmək olmuşdur. Bilavasitə tədqiqat ərazisinin məməlilər faunası haqqında ədəbiyyat məlumatları nadirdir və mövcud tapıntılar qonşu rayonları da əhatə etməklə Xəzəryanı sahələrə, Şamaxı, Abşeron, Qobustan və s. kimi ərazilərə şamil olunur.

TƏDQIQAT İŞİNİN MATERIAL VƏ METODLARI

Çöl işləri 2020-2021-ci illərdə Xızı rayonunun Şorabad (d.s. -23 m) və Sitalçay (d.s. -13 m) qəsəbələrindən başlayaraq d.s. 800 m-ə qədər qərb istiqamətində (15-20 km-dək) bütün fəsillərdə (qış istisna olmaqla) ümumilikdə 45 gün ərzində aparılmışdır. Ayrı-ayrı dəstələr üzrə ümumi qəbul olunmuş müşahidə və monitorinq metodları ilə [1] çöl işləri icra edilmiş, ədəbiyyat məlumatları və kolleksiya materialları nəzərdən keçirilmiş, məməlilərin növ tərkibi dəqiqləşdirilmişdir. Müşahidələr bilavasitə fərdlərin və ya onların həyat fəaliyyəti izlərinin qeydə alınması ilə aparılmışdır. Yarasalar səyyar və stasionar ultrasəs detektorları vasitəsilə həm qeydə alınmış, həm də onların transektlər üzrə nisbi say uçotu aparılmışdır. Gəmirici növlərinin (fon) nisbi say uçotu yuvaların sayılmasına əsaslanan dolayı hesablama üsulu ilə həyata keçirilmişdir.

TƏDQIQAT İŞİNİN ƏSASLANDIRILMASI VƏ NƏTİCƏLƏRİ

Rayon coğrafi baxımdan Böyük Qafqaz sıra dağlarının cənub-şərq qurtaracağını (Abşeron yarımadası və Qobustanla yanaşı) təşkil edir. Şimaldan Siyəzən və Quba, qərbdən Şamaxı, cənubdan Qobustan, cənub-şərqdən Abşeron rayonu ilə həmsərhəddir. Əsasən, Xızı yaylasında yerləşən rayonun şərq hissəsi Giləzi dili ilə Xəzər sularına açılır. Tipik yarımsəhradan başlayaraq, dağ meşələrinədək müxtəlif landşaft komplekslərini əhatə edir [2].

İki növ yereşən (*Crocivura guldenstaedti*, *C. leucodon*) Xaçmaz-Siyəzən əraziləri [3] və iki kirpi növü (*Hemiechinus auritus*, *Erinaceus concolor*) Abşeron yarımadası, Qobustan və Xaçmazdan [4, 5] məlumdur. Ədəbiyyata görə ərazidən təkcə küli şəbpərəsi - *Pipistrellus kuhlii* [4, 6] olduğu halda ətraf rayonlardan 15-dək yarası növü məlumdur. Xirepterofauna və ümumiyyətlə teriofauna üzrə Xızı ərazisinə yaxın ən geniş tədqiqat işləri Abşeron-Qobustana aiddir. 1998-2005-ci illərdə Abşeron-Qobustan ayrı-ayrı öyrənilmiş, yarası növlərinin sayı 13-ə çatmışdır [4]. Cədvəldə tədqiqat sahəsinə ən yaxın ərazilərdə tarixən qeydə alınmış yarası növlərinin siyahısı verilmişdir. Bunların əksəriyyəti tək-tək tapıntılara əsaslanır. Qeydə alınmış növlərin ümumi sayı 11-dir ki, bu da ölkə xirepterofaunasının təxminən 30%-ni təşkil edir.

Boz dovşan (*Lepus europaeus*) dəstənin (Lagomorpha) əraziyə aid yeganə və adi növüdür [4, 5, 7]. Gəmiricilərdən dağ ərəbdovşanı (*Allactaga williamsi*) Abşeron yarımadasından yuxarı bütün Xəzəryanı litoral ərazilər üçün, boz siçovul (*Rattus norvegicus*) Abşeron və Siyəzən istiqamətlərində Xəzəryanı sahillər üçün, ev siçanı (*Mus musculus*) tədqiqat ərazisi üçün, boz siçancıq (*Cricetullus migratorius*) isə bütün ölkə ərazisi üçün (alp zonası istisna olmaqla) qeydə alınmışdır. Qırmızıquyruq qum siçanı (*Meriones libycus*) və ictimai çöl siçanı (*Microtus socialis*) ölkəmizdə geniş yayılmış gəmirici növləri kimi göstərilir [5]. Bozqır meçə siçanı (*Sylvaemus witerbyie*) əvvəllər meşə siçanı kimi (*Apodemus fulvipectus*, *S. sylvaticus fulvipectus*), bütün qonşu ərazilər və Abşeron yarımadası [5] və Abşeron-Qobustan əraziləri üçün məlumdur [4]. 2000-ci illərə qədər yalnız Talış və Naxçıvan üçün göstərilən hind tirəndəzi arealını genişləndirərək tədqiqat ərazisinə də çatmışdır [8].

N.K. Vereşagin [5] Xızı da daxil olmaqla, Abşeron, Qobustan, Siyəzən əraziləri üçün Yırtıcılardan (Carnivora) adi çaqqalı (*Canis aureus*) göstərir. O, həmçinin boz canavarı (*Canis lupus*) və adi tülkünü (*Vulpes vulpes*) də Azərbaycanda geniş yayılmış növlər kimi qeyd edir. Qırmızı Kitab növü olan adi safsar (*Vormela peregusna*) və gəlincik (*Mustela nivalis*) sonralar qonşu Abşeron [5] və Qobustan ərazilərində [4] qeydə alınmışdır.

Tədqiqat ərazisi ədəbiyyatda ceyranın (*Gazella subgutturoza*) tarixi əraziləri kimi verilir - [5, 9]. 2000-ci illərin əvvəllərində ceyranlar əraziyə təkrar olaraq buraxılmışlar [4].

2020-2021-ci illərin davamlı gündüz və gecə çöl işləri ərzində 10 yarasa (Chiroptera), 4 həşəratyeyən (Insectivora), 5 gəmirici (Rodentia), 1 dovşankimi (Lagomorpha), 4 yırtıcı (Carnivora) və 1 cütdırnaqlı (Artiodactyla) növləri qeydə alınmışdır (Cədvəl).

Həşəratyeyənlər (Insectivora) - ərazidə iki kirpi növü tərəfimizdən qeydə alınmışdır - 1. *Erinaceus concolor* (ağdöş kirpi), 2. *Hemiechinus auritus* (qulaqlı kirpi). Ağdöş kirpi tipik quraqlıq sevən növ olmasa da, Xızının hətta yarımsəhra landşaflarının rütubətli stasiyalarında da qeydə alınır. Qulaqlı kirpi ərazidə landşaftın yalnız səhra və yarımsəhra elementləri ilə bağlıdır. Sitalçay ərazisindən tərəfimizdən 2 fərdi əldə edilmişdir. Yereşənlərdən bir növ - uzunquyruq ağdiş (*Crocedura guldenstaedti*) bir dəfə qeydə alınmışdır. Ağqarın ağdişin (*Crocidura leucodon*) ərazidə mövcudluğu ehtimal olunur.

Yarasalar (Chiroptera) – tərəfimizdən 11 yarasa növü - 1. *Rhinolophus ferrumequinum* (böyük nalburun), 2. *Pipistrellus nathusii* (meşə şəbpərəsi), 3. *Pipistrellus kuhlii* (küli şəbpərəsi), 4. *Myotis blythii* (itiqulaq gecə şəbpərəsi), 5. *M. alcaethoe* (alkato gecə şəbpərəsi), 6. *Eptesicus serotinus* (dağ gönlücəsi) fiziki olaraq əldə olunmuş, bunlarla yanaşı 7. *Hypsugo savii* (Savi gönlücəsi), 8. *Nyctalus noctula* (kürən axşam yarasası), 9. *Plecotus auritus* (qonur palazqulaq), 10. *Vespertilio murinus* (adi ikrəng gönlücə) və 11. *Eptesicus caspica* (səhra gönlücəsi) növlərinin ultrasəsli yalnız səyyar və ya stasionar detektorlar tərəfindən fiksə olunmuşdur.

Gəmiricilər (Rodentia) - 1. *Allactaga elater* (kiçik ərəbdovşanı), 2. *Allactaga williamsi* (Kiçik Asiya dağ ərəbdovşanı), 3. *Cricetulus migratorius* (boz siçancıq), 4. *Meriones libycus* (qırmızıquyruq qum siçanı), 5. *Microtus socialis* (ictimai çöl siçanı) tədqiqat ərazisində birbaşa qeydə alınmış, 6. *Hystrix indica* (adi tirəndəzi) ekskrementlərinə rast gəlinmişdir. Bütün növlər gecə və ya alatoranlıqda fəal olan gəmiricilərdir. Gecə marşrut uçotları Xızının şərq istiqamətindəki ovalıq və dağətəklərində kiçik ərəbdovşanının 3-5 fərd/km sıxlığa malik olduğunu göstərmişdir. Bu analoji biotopların tipik və dominant nümayəndəsidir. Relyef yüksəldikcə və mezofil stasiyalarda dominantlıq bozqır siçanlarının (*Sylvaemus*) payına düşür. Boz siçancıq bütün relyef elementlərinin geniş yayılmış, amma nadir və ya azsaylı növüdür.

Dovşankimilər (Lagomorpha) - boz dovşan (*Lepus europaeus*) ərazinin geniş yayılmış, adi və ya indikator növdür. Yarımsəhra və bozqırlarda daha çoxsaylıdır.

Yırtıcılar (Carnivora) – 1. *Canis aureus* (adi çaqqal), 2. *Canis lupus* (boz canavar) və 3. *Vulpes vulpes* (adi tülkü) bütün ərazi boyu qeydə alınmışdır. Adi tülkü ərazinin dominant yırtıcı növüdür və bütün landşaftlarda onun əsas qidasını gəmiricilər təşkil edir. Gəlincik (*Mustela nivalis*), adi safsar (*Vormela peregusna*) və adi porsuğun (*Meles meles*) ərazidə yayılması ehtimal olunur.

Cütdırnaqlılar (Artiodactyla) – bir fərd ceyran (*Gazella subgutturosa*) 2020-ci ilin payızında Xızının keçmiş Şərgah kəndi yaxınlığında qeydə alınmışdır. Ərazidə, xüsusilə Qobustanla sərhəd sahələrdə əsrin əvvəllərində geniş yayılsa da, əsrin ortalarına yaxın məhv edilmişdir. Reintroduksiya

proqramı çərçivəsində 2010-cu ilin dekabrında 10 başa qədər ceyran Abşeron-Qobustan ərazisinə buraxılmışdır.

Cədvəl

Ərazidə məlum olan məməli növləri (ədəbiyyat məlumatları və tədqiqat nəticələrinə əsasən)

N	Növün elmi adı	Qeydə alındığı yer	İstinad	Qeydə alınıb	Mövcudluq ehtimalı	Nisbi sayı	IUCN/QK
Yarasalar - Chiroptera							
1	<i>Rh. hipposideros</i>	Şamaxı, Qobustan	6		az		LC, QK
2	<i>Rh. blasii</i>	Şamaxı	6		az		
3	<i>Rh. mehelii</i>	Şamaxı, Bakı	6; 9		az		LC, QK
4	<i>Rh. ferrumequinum</i>	Şamaxı, Sündü, Kələxana, Bakı	4; 6	+		adi	LC, QK
5	<i>Myotis blythii</i>	Şamaxı, Sündü, Kələxana, Bakı qub., Qobustan Qoruğu	4; 6	+		adi	
6	<i>M. nattereri</i>	Şamaxı 750 m	4; 6		az		LC, QK
7	<i>M. mystacinus /alcatoe</i>	Bakı, Cənub-şərqi (CŞ) Şirvan	6	+		azsaylı	
8	<i>Barbastella caspica</i>	Şamaxı, Qubadlı, Qobustan	4; 6	+		azsaylı	LC, QK
9	<i>Nyctalus noctula</i>	Siyəzən	6	+			
10	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Siyəzən, CŞ Şirvan, Şamaxı, Bakı, Qobustan, Sahil	4; 5; 6		yüksək		
11	<i>P. nathusii</i>	Şamaxı, Abşeron, Bakı	4; 6; 9	+		miqrant	
12	<i>P. kuhlii</i>	Xızı daxil bütün regionda	4; 6	+		çoxsaylı	
13	<i>Hysugosavii</i>	Qobustan Qoruğu	4; 6	+		miqrant	
14	<i>Vespertiliomurinus</i>	Bakı vilayəti, Karkushlu	4; 6	+		miqrant	
15	<i>Eptesicusbottae</i>	Qobustan Qoruğu	4; 10	+		azsaylı	LC, QK
16	<i>E. serotinus</i>	Şamaxı, Qobustan Qoruğu, Şamaxı	4; 6	+		adi	
Həşəratçeyənlər - Insectivora							
17	<i>Erinaceus concolor</i>	Abşeron, Qobustan, Xaçmaz	5	+		adi	
18	<i>Hemiechinus auritus</i>	Abşeron, Qobustan, Xaçmaz	5	+		adi	
19	<i>Crocidura guldenstaedti</i>	Abşeron, Xaçmaz, Siyəzən	3; 5	+			
20	<i>Crocidura leucodon</i>	Abşeron, Xaçmaz, Siyəzən	3; 5		orta		
Dovşankimilər - Lagomorpha							
21	<i>Lepuseuropeaus</i>	Xızı daxil bütün regionda	3; 5	+		adi	
Gəmiricilər - Rodentia							
22	<i>Hystrix indica</i>	Qobustan, CŞ Şirvan,	5; 8	+		nadir	LC, QK
23	<i>Allactaga elater</i>	Abşeron y/adasından şimala Xəzəryanı ovalıq, Qobustan	4; 5	+		adi	
24	<i>Allactaga williamsii</i>	Qobustan, Cənub-şərqi Şirvan,	4; 5	+		çoxsaylı	
25	<i>Cricetulus migratorius</i>	Xızı daxil bütün regionda	4; 5	+		adi	
26	<i>Meriones libycus</i>	Xızı daxil bütün regionda	4; 5	+		çoxsaylı	

N	Növün elmi adı	Qeydə alındığı yer	İstinad	Qeydə alınıb	Mövcudluq ehtimalı	Nisbi sayı	IUCN/QK
						1	
27	<i>Microtus socialis</i>	Xızı daxil bütün regionda	4; 5	+		adi	
28	<i>Mus musculus</i>	Xızı daxil bütün regionda	4; 5		yüksək		
29	<i>Rattus norvegicus</i>	Abşeron, Siyəzən	4; 5		yüksək		
30	<i>Sylviaemus withetrbayi</i>	Qobustan Qoruğu, Abşeron	4; 5		yüksək		
Yırtıcılar - C a r n i v o r a							
31	<i>Canis aureus</i>	Abşeron, Qobustan, Siyəzən	5	+		adi	
32	<i>Canis lupus</i>	Xızı daxil bütün regionda	5; 9	+		nadir / adi	
33	<i>Vulpes vulpes</i>	Xızı daxil bütün regionda	5; 7	+		çoxsaylı	
34	<i>Mustela nivalis</i>	Qobustan, Abşeron	5		yüksək		
35	<i>Vormela peregusna</i>	Qobustan, Abşeron	5		orta		LC, QK
36	<i>Meles meles</i>	Qobustan-Abşeron sərhəddi, CŞ Şirvan	5		yüksək		
Cütdırnaqlılar - A r t i o d a c t i l a							
37	<i>Gazella subgutturoza</i>	Qobustan, Cənub-şərqi Şirvan	5	+		nadir	CE, QK

ƏDƏBİYYAT

1. Wilson, D. E., F. R. Cole, J. D. Nichols, R. Rudran, and M. S. Foster, eds. Measuring and Monitoring Biological Diversity: Standard Methods for Mammals. Washington, DC: Smithsonian Institution Press, 1996.
2. Müseyibov M.A. Azərbaycanın fiziki coğrafiyası. Bakı, 1998, 400 səh.
3. Гошуналнев А.Г. Землеройки (Soricidae) Азербайджана: Автореф. дисс. канд. биол. наук. Киев: 1990, 22 с.
4. Həsənov N.Ə., Raxmatulina İ.K. Abşeron-Qobustanın teriofaunasına dair // Azərbaycan Milli Elminin Xəbərləri, Biol. elm. ser, 2004, № 1-2, s. 95-107.
5. Верещагин И.К. Млекопитающие Кавказа. М.-Л.: 1959, 704 с.
6. Ракматуллина, И.К. Рукокрылые Азербайджана (Фауна, Экология, Зоогеография) / науч. ред. Г.Т. Мустафаев.- Баку: «СБС», 2005, 480 с.
7. Гидаятов Ю.Х. Материалы по экологии (распространение, численность и питание) лисиц в Азербайджане // Фауна и экология позвоночных Азербайджана, Баку: 1975, с. 74-124.
8. Ракматуллина И.К., Аскеров Э.К. Современный ареал дикобраза (*Hystrix indica* Kerr, 1799) в Восточном Закавказье. Консервация аридных и смешанных экосистем в Закавказье (Сбор. науч. трудов), Тбилиси, 2003: 56-57
9. Животный мир Азербайджана. Том. 3, Позвоночные. Академия наук Азербайджанской Республики, Институт Зоологии., Баку, 2000, 654 с.
10. Həsənov N.Ə., Əbdurəhmanova N.Y. Azərbaycanda səhra gönlüçəsinin (*Eptesicus bottae* Peter, 1869) sistematik statusu və ekologiyasına dair // Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri. Bakı: Elm, 2010, II-cild, s. 850-856.