

A.F.Mürzəyev

Sumqayıt şəhər Təcili Tibbi Yardım Xəstəxanası

SUMQAYIT ŞƏHƏRİNDƏ UŞAQLAR ARASINDA YOL-NƏQLİYYAT TRAVMATİZMİNİN ANALİZİ

Müasir dövrdə travmaların ağırlıq dərəcələrinin artması və zərərçəkənlər arasında ölüm hadisələri çoxluq təşkil etdiyi üçün Yol-nəqliyyat travmatizmi (YNT) öz aktuallığını itirmir. Belə ki, hazırda YNT-5-14 yaşlı uşaqlar arasında ölümün əsas səbəblərindən biri sayılır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (UST) məlumatına görə hər

il YNT-dən ölənlərin 25%-ni uşaqlar təşkil edir. Belə ki, Rusiya Federasiyasında 2002-ci ildə YNT-dən ölən 33 min insanın 11 minini uşaqlar təşkil edib. Belarusiyada uşaqların iştirakı ilə 900-YNT-i baş vermişdir və 100-dən çox uşaq həlak olmuş, 1000-ə yaxın isə müxtəlif dərəcəli zədələr almışdır. Qazaxıstanda hər il travmalarla əlaqədar 600000-dən çox insan səhiyyə ocaqlarına müraciət edirlər ki, onların hər 4 nəfərdən biri YNT ilə bağlı olur. Ukrayna Respublikasında isə 2000-ci ildə YNH ilə əlaqədar olaraq 296 uşaq xəstəxanalara müraciət etmişdir. Qonşu İran Respublikasında, Avropa və Amerikada o cümlədən Respublikamızda da bu göstəricilər yüksəkdir və hər bir dövlətin qarşısında duran ən vacib problemlərdən biri sayılır. YNT-dən dəyən iqtisadi zərər dəmiryolu, aviasiya, yanğın və daşqınlar zamanı dəyən zərərdən dəfələrlə çoxdur və bunun da əsas səbəblərindən biri YNH-dən zərərçəkənlərin 70%-dən çoxunun iş görmə qabiliyyəti, intellektual səviyyəsi yüksək olan insanların olmasıdır. Uşaq əhalisinin sayı 100000-dən çox olan Sumqayıt şəhəri də Respublikamızın iri sənaye şəhəri olduğu üçün uşaqlar arasında UNT-nin səviyyəsi çox yüksəkdir və ölümün səviyyəsi son 5 ildə 17,78% təşkil etmişdir. (3,4)

dərəcəsinin vaxtında təyin olunmamasıdır. Buraxılan digər taktiki səhvlər isə aşağıdakılardır:

- Şok əlamətləri olan xəstələrdə cərrahi müdaxilənin həcmi artırılmaması.
- Döş qəfəsinin travmalarından ağ ciyərlərin slini ventilyasiyası zamanı plevral boşluğun drenaj edilməsi.
- Plevra və qarın boşlubunda massiv qanaxması olan xəstələrdə renfuziyadan səmərəli istifadə olunmaması.
- Polifrakturalar zamanı sümük fraqmentlərinin stabil fiksasiyası metodlarından çox az istifadə olunması.

Aparılan araşdırmalardan belə nəticəyə gəlmək olar ki, inkişaf etmiş iri sənaye şəhərlərində YNT-dən uşaqlar arasında letallıq digər şəhər və regionlara nisbətən 4-6 dəfə çoxdur və eyni zamanda ağır travmaların sayı da bu illərdə kəskin artmaqdadır. Belə ki, nəqliyyatın sayının intensiv artmasını nəzərə alaraq, uşaqlar arasında YNT-nin 3-5% səviyyəsində artmasını proqnozlaşdırmaq olar.

Beləliklə, aydın olur ki, UNT zamanı tibbi yardımın keyfiyyətini və təşkilini yaxşılaşdırmaq mümkün olsa onda uşaqlar arasında ölümün səviyyəsini 10-15% aşağı salmaq olar. YNH-i zamanı zərəcəkmış uşaqlara tibbi yardım keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə etaplı müalicəni təşkil etmək məqsədilə bir sıra təşkilatı tədbirlər görülməlidir. Hər şeydən əvvəl vahid informasiya mərkəzi yaradılmalıdır. Bu məsələni həll etmək məqsədilə YNT-nin profilaktikası, YNH-nin nəticələrini ləğv etmək məqsədilə yerli ərazilərin səhiyyə orqanlarının və tibbi yardım bütün mərhələlərində göstərilən yardımın və müalicənin, reabilitasiyasının keyfiyyətini yaxşılaşdırmaqla bütün aidiyyəti orqanların birgə iş prinsiplərini təşkil etmək lazımdır.

Digər əsas faktorlardan biri də təcili tibbi yardım briqadaları ilə-stasionar dispetcher məntəqələri və DAM-işçiləri arasında operativ əlaqə və xidmət kanalı yaradılmalıdır. Uşaq YNT-nin problemini effektiv yollarla həll etmək məqsədilə müəsisələr arası metodik - təşkilatı mərkəz yaradılmalıdır ki, bunun da əsas funksiyası koordinasiya hesabına YNH-nin tibbi nəticələrini vaxtında aradan qaldırmaqdır. Hal-hazırda isə respublikamızda belə bir xidmət mərkəzi fəaliyyət göstərmir. Nəqliyyatın sayının son illər ərzində artmasını nəzərə alaraq müasir dövürdə konkret effektiv profilaktik tədbirlər planı hazırlamalıdır.

РЕЗЮМЕ

АНАЛИЗ ДТТ СРЕДИ ДЕТЕЙ В г. СУМГАИТ

А.Ф.Мирзоев

Больница скорой медицинской помощи г. Сумгаит

В настоящее время в мире основным показателем смертности детей 5-14 лет является дорожно-транспортный травматизм (ДТТ). Этот показатель остается высоким как в соседних государствах, так в Европе и Америке, что является проблемой ВОЗ и, еще раз показывает, какой важной бедой является для здравоохранения.

Уровень смертности среди детей от ДТТ для города Сумгаит, где детское население около 100 тыс., составляет 16,67 %, что показывает важность этой проблемы и нуждается в неотложном решении. В результате первичного анализа было выявлено что, время и качество, оказываемой первой медицинской помощи являются низкими. Пострадавшие доставляются в лечебные учреждения в 90% случаях попутным транспортом, и только в 10% случаях – бригадами скорой медицинской помощи, в результате чего смертные случаи среди детей, пострадавших от ДТТ (черепно-мозговые травмы и комбинированные травмы) преобладают. 84,5% пострадавших были пешеходы, 14,7%-пассажиры, 0,8% - водители.

Был проведен анализ послеоперативного лечения, диагностических ошибок дооперационного лечения и были даны соответствующие советы.

Итак, проведенный анализ показал высокий уровень детской смертности среди детей от ДТТ. Есть необходимость создания в г. Сумгаите детского травмпункта, запасной хирургической бригады или в составе бригад скорой медицинской помощи.

ƏDƏBİYYAT

1. Азолов В.В., Бенуа Н.Н., Троицкий В.Г. Проблемы автодорожного травматизма, Горький, 1985.
2. Гузев В.А. Профилактика дорожно-транспортного травматизма. Москва 1990.
3. Истомин Г.П. Организация пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях. Москва 1990.
4. Факты и цифры ЕРБ. ВОЗ/03/04 Копенгаген, Рим, 6.IV.2004.
5. Малохов О.А., Розинов В.М., Левинова И.В., Бурмин И.А. Анализ детского дорожно-транспортного травматизма. Москва, 2004.